



**BUÜ HASTANESİ**  
**EKSTRAVAZASYON HASTA BİLGİLENDİRME FORMU**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Doküman Kodu     | EY.FR.10.409.06 |
| İlk Yayın Tarihi | 01.09.2025      |
| Revizyon No      | 00              |
| Revizyon Tarihi  | --              |
| Sayfa            | 1/1             |

**KEMOTERAPİ İLAÇLARININ DAMAR DIŞINA SIZDIĞINDAN ŞÜPHELENİLEN DURUMLARDA**  
**YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALARA İLİŞKİN BİLGİLER**

Kemoterapi tedavisi alırken bazı ilaçlar .....’a yerleştirilen iğnenin damar dışına çıkması sonucu çevre dokuya sızabilir. Doku hasarı riskini ve rahatsızlık hissini azaltmak için aşağıdaki önerilere uyunuz.

☐ Önümüzdeki 2-3 gün için günde 4 kez 15-20 dakika süre ile SOĞUK kompres uygulayınız. Bu uygulamaya ...../...../..... tarihine kadar devam ediniz.

☐ Önümüzdeki 2-3 gün için günde 4 kez 15-20 dakika süre ile SICAK kompres uygulayınız. Mümkünse bu uygulamayı daha sık yapmaya çalışınız ve bu uygulamaya ...../...../..... tarihine kadar devam ediniz.

➤ Bu uygulamalar rahatsızlık hissini arttırıyor ise uygulamaya ara verip doktorunuzu ya da hemşirenizi arayınız.

☐ Kolunuzu 1-2 yastıkla destekleyerek kalp seviyesinin üstünde tutmaya çalışınız.

☐ Doktor ya da Hemşirenizin görüşünü almadan bu bölgeye, krem, losyon ya da herhangi bir ilaç uygulamayınız.

☐ Bu bölgeye direk basınç uygulamayınız. Bandaj ya da sıkı sargı uygulamayınız.

☐ Bu bölgede aşağıdaki semptomlardan herhangi birisi olduğunda doktor ya da hemşirenize mutlaka bildiriniz:

- İlaç verilen damar etrafında kırmızılık, şişlik, yanma ya da ağrı hissi
- Cilt üzerinde siyahlık ya da ciltte soyulma
- Omuz, el ya da bilekte hareket güçlüğü
- Etkilenen bölgede sıcaklık artışı

**BUÜ-SUAM Onkoloji Polikliniği Gündüz Tedavi Ünitesi**  
**Telefon Numarası: 0224 2951346**