



ALERJİ DERİ TESTLERİ ÖNCESİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR

EY.FR.10.419.11

Bazı ilaçlar alerji deri testlerinin sonuçlarını etkileyebilir. Ağızdan tablet veya şurup şeklinde alınan bazı ilaçlar (Alerji veya astım ilaçları, öksürük şurupları, grip ve soğuk algınlığı ilaçları, taşıt tutması için kullanılan ilaçlar vb.) alerji testlerinin sonuçlarının yanlış negatif çıkmasına neden olmaktadır.

Alerji testleri uygulanacak hastaların bu ilaçları testten önce belli süreler kesmeleri gereklidir.

Alerji deri testleri hastaya acı vermeyen, kısa sürede (20 dakika) sonuçlanan bir testtir. Alerjik astım, alerjik rinit (alerjik nezle), ürtiker (kurdeşen), besin alerjisi, arı alerjisi gibi alerjik hastalıkların tanısında uygulanır. Genellikle kolun iç kısmına uygulanır. Bireyin herhangi bir alerjene duyarlılığını araştıran testlerdir.

ALERJİ DERİ TESTİNDEN ÖNCE KESİLMESİ GEREKEN İLAÇLARIN LİSTESİ

Bu listede olan veya olmayan bir ilaç kullanıyorsanız test planlama aşamasında lütfen bildiriniz.

1-) Testten 7 gün önce kesilmesi gereken ilaçlar (Ağızdan alınan alerji ilaçları):

Zyrtec, Allerset, Deloday, Claritin, Alerius, Xyzal, Atarax, Avil, Zaditen ve Astafen, Hitrizin, Setiral, Rupafin, Bilaxten, Sipraktin, Yenizin, Cetryn, Alarin, Alores, Loradif, Loritine, Doxafin, Desrinal, Crebros, Fumast, Telfast, Feksofen ve eşdeğeri olan diğer ilaçlar.

2-) Testten 5 gün önce kesilmesi gereken ilaçlar (Ağızdan alınan tablet veya şurup şeklindeki tüm soğuk algınlığı, nezle ve grip ilaçları):

Aferin, İburamin cold, Katarin, İburamin zero, Peditus, Benadryl, Fenotral, Allenik, Tavegy, Vistaril, Sudafed, Actifed, Actidem, Babyrhinol, Tylo hot, Vicks vapodray, Coldaway Cold, Forza, Benil, Benical, Antibeksin.

3-) Testten 4 hafta önce kesilmesi gereken ilaçlar (Ağızdan alınan kortizonlu ilaçlar 15 günden uzun süreyle kullanılmış ise):

Prednol, Flantadin, Deltakortil, Dekort vb. (Koldaki test bölgesine uygulanan kortizonlu deri merhemleri 5 gün önce kesilmelidir).

4-) Testten 1 gün önce kesilmesi gereken ilaçlar:

Famodin, Ranitab, Zantac, vb.

5-) Testten 7 gün önce kesilmesi uygun olan ilaçlar: Kombine ilaçlar (Monax, Airlast, Desmont, Levmont, Levokast, Fixdual, Narisat, Zespira plus, Aircomb, Airpass, Deloday plus ve eşdeğeri olan diğer ilaçlar)

6-) Xolair (Omalizumab) (iğne şeklinde uygulanan) testten 6 hafta önce kesilmelidir.

7-) Antidepresan (Trisiklik) ilaçlar (Laroxyl, Anafranil, Tofranil, İnsomin vb.) testten 7 gün önce kesilmelidir.

TESTİ YAPTIRMADAN ÖNCE KESİLMESİ GEREKMEYEN İLAÇLAR:

1-) Solunum yolu ile alınan astım ilaçları:

Flixotide, Flixon, Flixair, Pulmicort, Ventolin, Bricanyl, İnflacort, Cortair, Budecort, Respiro, Symbicort, Seretide, Miflonide, Budair, Giona, Asmanex ve eş değerleri.

Ventosal, Salbutol, Serevent, Foradil, Astmarole, Foryxa, Foradil combi, Ventofo combi, Ventide, İntal, Atrovent, Combivent ve eş değerleri.

2-) Burun spreyleri ve göz damlaları:

Nasonex, Nazoster, Nasocort, Rhinocort, Flixonase, Avamys, Rinoclenil, Risonel, Dalman, Mometix, Allergochrom, Allergodil, Rynachrom-m, Nazofix, Beklomil, Momecon, İliadin, Otrivine, Rhinfant spray, Allergo comod göz damlası, Zaditen göz damlası ve eş değerleri.

3-) Deride test bölgesi dışına uygulanan kortizonlu deri merhemleri.

4-) Antibiyotikler ve ateş düşürücü ilaçlar.

TEŞEKKÜR EDERİZ

Çocuk Alerji Laboratuvarı: (224) 295 05 07 - 295 05 08

Randevu telefonu - Çocuk Alerji ve Çocuk Göğüs Poliklinikleri Sekreter: (224) 295 05 23

Randevu çağrı merkezi: (224) 552 05 61-552 05 62

Web randevu: <http://hastarandevu.uludag.edu.tr/MiaHbysRandevu>

Çocuk Alerji ve Çocuk Göğüs poliklinikleri iletişim tel: (224) 295 05 05 ve 295 04 42