



YENİDOĞANDA SARILIK

EY.FR.10.421.02

Tanım: Yenidoğan bebeklerde sarılık, çeşitli nedenlere bağlı olarak bilirubin denilen maddenin atılamayıp ciltte birikmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.

Sıklık: Sarılık, zamanında doğan bebeklerin %60'ında, erken doğan bebeklerin %80'inde hayatın ilk günlerinde görülmektedir.

Nedenleri nelerdir ? Başlıca nedenleri;

- Yenidoğan bebeklerin karaciğer fonksiyonlarının henüz tam gelişmemiş olması bu nedenle bilirubin maddesinin vücuttan uzaklaştırılamaması
- Anne ile bebek arasında Rh veya kan grubu uyumsuzluğu olması
- Bazı enzim eksiklikleri
- Doğumsal kan hastalıkları
- Karaciğer hastalıkları
- Enfeksiyonlar
- Anne sütü

Sarılık fark edildiğinde ne yapılmalıdır ?

Bebeginizde sarılık olduğu takdirde bu sarılığın miktarı ve sarılığa neden olabilecek diğer hastalıklar yönünden bebekten kan tahlilleri ve idrar tahlili gerekmektedir. Bebeğe saptanan sarılığın durumuna göre fototerapi (ışık tedavisi) uygulanmaktadır. Sarılık düzeyinin çok daha fazla yüksek olduğu ve beyin hasarına yol açma riskinin bulunduğu durumlarda bebeğe kan değişimi uygulanabilmektedir. Yapılmadığı takdirde bebekte kalıcı geri dönüşümsüz beyin hasarı ve işitme kaybı gelişebilir. Kan değişimi sırasında bebeğin göbeğindeki damara kateter yerleştirilerek uygun olarak testleri yapılan kan ile bebeğin kanı değiştirilmektedir. Bu işlem sırasında azami özen gösterilse dahi bir takım riskler söz konusu olabilmektedir. Bu riskler enfeksiyon, damar içi pıhtı oluşumu ve buna bağlı bozukluklar, trombosit düşüklüğü, kan şekeri ve kan biyokimyasal değerlerinde bozukluklar, kan gazı bozuklukları, bağırsaklarda nekrotizan enterokolit denilen klinik durumdur.

Gidişatı nasıldır ?

Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): Çocuk Yenidoğan Bilim Dalı

Sayfa 1 / 2

İlk yayın tarihi: 01.09.2025

Rev No : 00

Rev Tarihi :

Yenidođan sarılıđı çođu kez zararsız ve kendiliđinden düzelen bir durum olsa da sarılıđın belli seviyenin üzerinde artması bebeklerde beyinde, işitme sisteminde kalıcı zedelenmeye sebep olabilmektedir.

İzlemi gerekli mi ?

Özellikle kan deđişimi gerektirecek kadar yüksek düzeylerde sarılıđı olan bebeklerin işitme fonksiyonları yönünden takibi gereklidir. Daha düşük düzeylerde sarılıđı olan bebeklerde herhangi bir risk bulunmamaktadır.