



ASPIRİN KULLANAN ÇOCUK HASTALAR İÇİN ÖNERİLER

EY.FR.10.422.01

Aspirin, eski bir ilaç olmasına karşın halen bir çok hastalık için vazgeçilmez niteliktedir. Bununla birlikte kullanımda dikkat edilmesi, yan etkilerinin bilinmesi ve dikkatli olunması gerekmektedir. Mideyi tahriş edip, midede ağrı, yanma, ekşime yapabilir. Bu nedenle tok karnına alınması daha uygundur. Yine de şikayete yol açarsa, gerektiğinde süt veya antiasid gibi mideyi koruyucu ilaçlarla da alınabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

- Kulak çınlaması,
- Bulantı,
- Kusma,
- Baş ağrısı,
- Vücutta yer yer morluklar oluşması,
- Siyah renkte kaka yapma
- herhangi bir yerden kanama görülmesi (burun kanaması gibi)

halinde ilaç kesilip doktora gidilmelidir.

Aspirin kullanıldığı sırada SU ÇİÇEĞİ çıkarılması veya su çiçeği çıkaran biri ile temas halinde ilaç hemen kesilmeli ve doktora haber verilmelidir.

İletişim Adresi:

Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
Görükle 16059, Bursa
Tel: 0-224-2950450
Çocuk Acil Tel: 0-224-2950000 -2953271