



BRAKİTERAPİ UYGULANACAK HASTALARIN BİLGİLENDİRİLMESİ

EY.FR.10.432.06

- Brakiterapi yöntemi, jinekolojik kanser tedavisinde tek başına veya eksternal radyoterapi ile birlikte uygulanan standart tedavi yöntemidir.
- Bu tedavi kadın hastalıkları muayenesi gibi genital bölgeden yapılmakta, içeriye radyasyon vermek için bir aplikatör yerleştirilmektedir. Toplam tedavi 3 kez yapılmaktadır. İlk tedavide tomografi çekimi yapıldığından tedavi süresi 30-45 dakika sürmekte, diğer iki tedavi 10-15 dakikada bitmektedir.
- Tedaviden bir gün önce oluşabilecek idrar yolu enfeksiyonlarını önlemek açısından antibiyotik başlanmalı ve tedavi sürecinde kullanılmalıdır.
- Bir gece öncesinden barsak temizliği için lavman 1x1 makattan uygulanmalıdır.
- Mesanenin dolu olması için 1 litre su her işlem öncesi kontrollü içilmelidir.
- İşlem öncesi sulu-yumuşak ve gaz yapmayan gıda alınabilir.
- Sürekli kullanılan ilaçlar (tansiyon,kalp, şeker ilacı vb) içilebilir.
- Geldiğinizde başvuru deskinde kaydınızı açtırıp hemşire odasına geldiğinizi bildirmelisiniz.
- Tedavinin yapılmasında birçok çalışanın (doktor,hemşire,tekniker,sağlık fizikçisi ve personel) organize olması gerektiğinden biraz bekleyebilirsiniz.
- Tedavi kadın hastalıkları muayenesi gibi olmakta işlemi doktorunuz ve hemşireniz yapmaktadır.
- Tedaviye gelirken önceki tedavilerinize ait evraklarınızı yanınızda getiriniz.
- Tedavi sonrası veya yaşa bağlı haznede kuruluk, daralma konusunda bilgi verilir. Cinsel yaşamın devamı önerilir. Ancak cinsel yaşam devamı olmayan hastalarda haznenin daralmaması ve jinekolojik muayeneye engel teşkil etmemesi için brakiterapi hemşireleri ve ilgili hekimler tarafından gerekli öneriler verilir.

HAZIRLAYAN

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİ ANABİLİM DALI

RADYASYON ONKOLOJİSİ HEMŞİRESİ GÜLHAN MUSLU

RADYASYON ONKOLOJİSİ HEMŞİRESİ AYLAR DURAK

DANISILAN

DOÇ.DR. CANDAN DEMİRÖZ ABAKAY