



DOĞUM SONRASI ÖNERİLER

FR-HYE-04-312-08

Doğumdan sonraki 6 haftalık (42 gün) döneme lohusalık dönemi denir. Bu dönemde, vücut tekrar gebelik öncesi haline döner.

Doğumdan sonraki 3-4 gün boyunca pıhtılı kanamanız olacaktır. Daha sonra kanama miktarı azalacak, geçen günlerle birlikte rengi açılarak, yerini sarı-beyaz renkli bir akıntıya bırakacaktır. Bu akıntı ise hemen hemen lohusalığın sonuna kadar devam edecektir.

Doğum sonrasında dikkat edilmesi gerekli hususlar şu şekilde özetlenebilir:

- **Rahim Masajı:** Karnınıza bastırduğunuzda rahminizi hissedebilirsiniz. Doğumda göbek hizasında olan rahminiz, hergün 1-2 cm kadar küçülür ve 2. haftada ele gelmez olur. İlk günlerde daha sık olmak üzere, günde 8-10 kez rahim tepesine biraz kuvvetlice yapacağınız, 20-30 sn süreli ovma hareketi, rahminizin küçülmesini hızlandırır. Bu sayede hem kanamanız az olur, hem de enfeksiyon gelişme riski bertaraf edilmiş olur. Bu masajlar esnasında bir miktar ağrı hissedebilirsiniz ve siz masaj yaptıkça rahminizin sertleştiğini hissedersiniz.
- **Ağrı:** Doğum ve sezeryan sonrasında, dönem dönem ağrı hissedebilirsiniz. Çok şiddetli olmadıkça, size reçete edilen ağrı kesicilerden günde 3-4 kez alabilirsiniz. Doğum sonrası dikiş yerlerinizdeki ağrı, özellikle oturduğunuz zamanlarda sizi rahatsız ediyorsa, reçetede ki kremi dikiş kenarlarına sürebilirsiniz. Sezeryan sonrasında ise, birkaç hafta boyunca dikiş köşelerinin biraz daha üst kısmında ağrı hissedebilirsiniz.
- **Ateş ve Terleme:** Doğum sonrasında hafif ateşiniz olabilir. Ayrıca bol terleme ve sık sık idrara gitme ile vücudunuzda biriken suyu atarsınız. Eğer 38 ° C üzerinde ateşiniz olursa önce göğüslerinizi yoklayın. Göğüslerde süt birikmesi (göğüslerin aşırı sert ve hassas olması ile anlaşılır) ateşe neden olabilir. Böyle bir durumda göğüslerinizi yumuşayınca kadar tirlle (meme pompası) yardımı ve masajla boşaltın. 1 saat sonra ateş halen yüksek ise önemli bir duruma işaret ediyor olabilir.
- **Yara Yerlerinin Bakımı:** Normal doğumlarda yapılan dikişlerin iyileşmesinde iki hususa dikkat etmelisiniz. **Temizlik ve kuruluk.** Size reçete edilen tentürdiyot benzeri sıvıyı 1 lt. Pet şişe su ile karıştırdınız ve daima ağzı kapalı bir şekilde muhafaza ediniz. Her tuvaletten sonra temiz bir pamuğu bu su ile bolca ıslatarak, genital bölgenizi, önden arkaya doğru silin ve

pamuđu atın. Bu uygulamaya bir hafta - 10 gn devam edin. Sık sık pet deęiřtirerek genital blgenin temiz ve kuru kalmasını saęlayın.

Sezeryan sonrasında ise, gnde bir kez temiz bir steril kare gaz yardımıyla, bu solsyonla yara yerini silin (solsyonu sulandırmadan). Bir haftalık uygulama yeterli olacaktır.

- **Beslenme:** Lohusalık dneminde beslenme, gebelikteki gibidir. Bol sıvı almayı ihmal etmeyin. Gaz yapıcı gıdaları yemeyin. Ayrıca, doęumla birlikte oluřan kanamanın getireceęi eksiklięi gidermek ve stnzn kalitesini artırmak bakımından, demir-vitamin haplarınıza en az 3 ay kadar daha devam etmelisiniz.

- **Hareket:** İster sezeryanla, isterseniz normal yolla doęum yapın, eve gittięinizde kendinizi yataęa baęlamaktan kaçıının. řphesiz istirahat edeceksiniz, ama uzun sre yatmanın damarlarda pıhtı oluřması gibi,bir takım riskleri de beraberinde getireceęini hatrınızda tutun. Kendinizi ne kadar abuk yataktan kurtarırsanız, o kadar abuk iyileřirsiniz. Normal doęumdan bir hafta sonrasında itibaren hafif egzersizlere bařlayın ve özellikle karın kaslarınızı, kala ve sırt kaslarınız kuvvetlendirici egzersizler yapın.

Sezeryan sonrası 6 ay boyunca, dikiřlerinizi zorlayıcı hareketlerden ve aęır eřyaları (su dolu kova, aęır valiz, koltuk gibi) kaldırmaktan kaçıınmalısınız. Ayrıca ilk birkaç hafta boyunca, ksrrken, doęrulurken ellerinizle dikiřlerinizi destekleyin (Ama kolay kolay aılmayacak kadar saęlam olduęunu da bilin).

- **Banyo:** Normal doęumdan sonra eve gittięinizde, sezeryan sonrasında ise 7. gnde banyo yapabilirsiniz. Tm lohusalık dnemi boyunca banyonuzu ayakta duř řeklinde yapın ve kvete ve havuza girmeyin.

- **Cinsel İliřki:** Lohusalık bir iyileřme dnemidir. Bu nedenle, lohusalıęın sonuna kadar iliřki sakıncalıdır.

Doęumdan sonra taburcu iřlemlerinizin en az 24 saat sonra ve hem annenin hem de bebeęin tetkikleri tamamlandıktan sonra yapılmasını neriyoruz. Bu sre, hem annede hem de bebekte ortaya ıkabilecek problemlerin zamanında fark edilmesi iin gereklidir. Kendiniz ve bebeęinizin saęlıęı iin, erken taburcu olmakta ısrar etmeyiniz.

EMZİRME: 2 saat aralıklarla emzirmelidir. Her meme iin emzirme sresi 10 dakika olmalıdır. Bylece bir emzirmede 20 dakika harcanmalıdır. Bir emzirmeye saę meme ile bařlanmışsa, ikincide sol meme ile bařlanmalı, her iki memenin de stnn verilmesi iin dięer meme de

çocuđa verilmelidir.

Emzirme yatarak olmamalıdır. Oturarak, ayakta olabilir. Bebek 45 derecelik açıyla başı yukarda tutularak yapılmalıdır.

1,5 ay sonra doğum yapmış bir annenin muayenesi gereklidir. Böylece, doğum sonrası normale dönüşün ne kadar gerçekleşebildiđine bakılır. Bu muayene sırasında korunma yöntemleri hakkında da bilgi verilir.