



Aşılama gerekli midir?

- Türkiye’de her yıl aşı ile korunabilir hastalıklar nedeniyle yaklaşık 12 bin bebeğin öldüğü göz önüne alınırsa , aşılanmanın ve tekrarı gereken aşıların takibinin önemi daha çok ortaya çıkmaktadır.
- Kitle aşılama programları ve çocukların rutin aşılanmalarıyla difteri, tetanos ve çocuk felci nadir görülen hastalıklar arasına girerken, günümüzde çiçek hastalığına hiç rastlanmamaktadır .
- Hastalık oluşmadan, aşıyla vücuda verilen antijenle, antikor (vücudu koruyan madde) üretimi sağlanıyor ve hastalık etkeni ile karşılaşıldığında vücut kendini korumaya hazır oluyor.
- Aşılar tek veya karma olarak uygulanabiliyor.
- Bazı aşılar tek doz verildiğinde ömür boyu koruyuculuk sağlarken, bazılarının ise tekrarı gerekiyor. Bir aşının koruyucu etki gösterebilmesi için uygun yaşlarda ve aralıklarda yaptırılması gerek.
- En üst seviyede koruma için “Aşı Takvimi”ne uymak gerekiyor. Hepatit B, Verem, Difteri, Tetanos, Boğmaca, Çocuk Felci, Menenjit, Kızamık, Kabakulak, Kızamıkçık, Su Çiçeği, Hepatit A hastalıkları ile bunlara bağlı ölüm ve sakatlıkları engelleyebilmek için, ebeveynlerin bebeklerini doğdukları ilk aylardan itibaren aşılatmaya başlamaları gerekmektedir.

Aşı takvimi

Aşıyla engellenebilecek hastalıklar için takip edilmesi gereken aşı takvimi :

BCG: Verem aşısı

- Tercihan 3.ayda İlk 6.ayda PPD yapılmadan aşı uygulanır, daha sonra PPD yapılarak (negatif ise) BCG yapılır.
- 6 yaşında PPD kontrolüyle 2.BCG aşısı
- 6 yaştan sonra PPD negatif olgulara yapılır

I- Karma aşı: (Difteri+Boğmaca+Tetanos)

Bebek 2, 4 ve 6 aylıkken yapılır. 1. tekrarı bebek 18 aylık olunca, 2. tekrar ilk tekrardan 3 yıl sonra, 3. tekrar 2. tekrardan 3-4 yıl sonra yapılır.

II- Not: 6 yaştan büyüklere sadece D.T (Difteri - Tetanos) yapılır.

* Tetanos aşısını herkesin yaşamı boyunca 10 yıl aralıklarla yaptırmaları gerekir.

III- Çocuk felci: (Polio)

Bebek 2, 4 ve 6 aylıkken yapılır. 1. tekrarı bebek 18 aylık olunca, 2. tekrar ilk tekrardan 3 yıl sonra, 3. tekrar bir öncekinden 3-4 yıl sonra yapılır.

IV- Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak aşısı:

Bir yaşından sonra (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) karma aşı yapılması gerekir. Tekrarı 5 yıl sonra KKK şeklinde yapılır.

V- Hepatit B (Sarılık aşısı): Doğumdan sonra ilk dozu sonra 1. ve 6. aylarda olmak üzere 3 doz yapılır.

Bütün hamile annelere Hepatit B laboratuvar araştırması yapılması gerekir.

Hepatit marker'ları pozitif olan annede (HbsAg ve HbeAg pozitif ise) doğacak bebeğe uygulanacak aşılama programı; Doğumdan hemen sonra veya ilk 8 saat içinde Hepatitis B immune Globulin (200 I.U) yapılır. Immune globulin ile aynı anda veya en geç bir hafta sonra Hepatitis B aşısı yapılır.

VI- Hepatit A aşısı:

2 yaşından sonra yapılması önerilir. 5 yaşına kadar laboratuvar tetkiklerine ihtiyaç yoktur. 5 yaşından büyüklere aşıdan önce anti-HAV IgG testi yapılır. Aşı 6 ay ara ile 2 doz uygulanır.

VII- ACT - HİB (Hemofilüs influenza - B):menenjit karşı yapılan aşı.

Bebekler 2, 4 ve 6 aylıkken 3 aşı yapılır. Bir yıl sonra 1. Rapel (tekrar) yapılır. 6 ay ile 1 yaş arasındaki çocuklara 2 ay ara ile 2 aşı yapılır. Bir yıl sonra 1. rapel yapılır. 1 yaş ile 5 yaş arasındaki çocuklara tek doz (bir aşı) yapılır.

VIII- Suçiçeği aşısı:

Bir yaşın üzerindeki çocuklara önerilir. Aşı deri altına yapılır. Bağışıklık sistemi bozuk olanlara yapılmaz.

IX- Pnömonokok aşısı; menenjit karşı korumak amacıyla yapılır. Bebekler 2, 4 ve 6 aylıkken 3 aşı yapılır. Bir yıl sonra 1. Rapel (tekrar) yapılır.