



ALERJİ DERİ TESTLERİ ÖNCESİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR

FR-HYE-04-419-11

Alerji deri testleri hastaya acı vermeyen, kısa sürede (20 dakika) sonuçlanan bir testtir. Alerjik astım, alerjik rinit (alerjik nezle), ürtiker (kurdeşen), besin alerjisi, arı alerjisi gibi alerjik hastalıklarının tanısında uygulanır. Genellikle kolun iç kısmına uygulanır. Alerjen içeren sıvı test materyali deriye damlatılır, alerjen damlatılan deri yüzeyine 'lanset' adı verilen steril ve tek kullanımlık ucu sivri materyallerle uygulama yapılır. Test uygulandıktan sonra 15-20 dakika beklenir ve takiben elde edilen deri testi sonuçları değerlendirilir.

Bazı ilaçlar alerji testlerinin sonuçlarını etkileyebilir. Alerji veya astım ilaçları, öksürük şurupları, grip ve soğuk algınlığı ilaçları, taşıt tutması için kullanılan bazı ilaçlar alerji testlerinin sonuçlarının yanlış negatif çıkmasına neden olmaktadır. Alerji testleri uygulanacak hastaların bu ilaçları testten belli süreler öncesinde kesmeleri gereklidir.

ALERJİ DERİ TESTLERİNDEN ÖNCE KESİLMESİ GEREKEN İLAÇLARIN LİSTESİ

Bu listede olan veya olmayan bir ilaç kullanıyorsanız test planlama aşamasında lütfen bildiriniz.

1-) Testten 7 gün önce kesilmesi gereken ilaçlar:

Antihistaminik ilaçlar: Zrytec, Allerset, Claritin, Aerijs, Xyzal, Atarax, Avil, Deloday, Hitrizin, Setiral, Yenizin, Cetryn, Alarin, Loradif, Loritine, Doxafin, Desrinal, Crebos, Zaditen, Astafen, Fumast, Telfast, Feksofen.

2-) Testten 5 gün önce kesilmesi gereken ilaçlar:

Benadryl, Fenotral, Allenik, Tavegyl, Vistaril, Sudafed, Actifed, Actidem, Aferin, Babyrhinol, Katarin, Tylo hot, İburamin cold, Vicks vapodray.

3-) Testten 5 gün önce kesilmesi gereken ilaçlar:

Singular, Zespira, Notta, Airfix, Onceair, Carrox, Monax, Airlast.

4-) Testten 4 hafta önce kesilmesi gereken ilaçlar (15 günden uzun süreyle kullanılmış ise) :

Ağızdan alınan Kortizonlu ilaçlar: Prednol, Flantadin, Deltakortil, vb.

(Kortizonlu deri merhemleri test bölgesine uygulanıyor ise 5 gün önce kesilmelidir).

5-) Testten yapılacağı sabah alınmaması gereken ilaçlar:

Famodin, Ranitab, Zantac, vb.

TESTİ YAPTIRMADAN ÖNCE KESİLMESİ GEREKMEYEN İLAÇLAR:

Solunum yolu ile alınan Astım ilaçları:

Flixotide, Pulmicort, Ventolin, Bricanyl, İnflacort, Miflonide, Budair, Giona, Asmanex.

Ventosal, Salbutol.

Serevent, Foradil, Astmarole, Foryxa.

Seretide, Foradil combi, Ventofor combi, Symbicort, Ventide.

İntal, Atrovent, Combivent.

Burun spreyleri ve göz damlaları:

Nasonex, Nazoster, Nasocort, Rhinocort, Flixonase, Avamys, Rinoclenil, Risonel, Dalman, Mometix, Allergochrom, Allergodil, Rynachrom-m.
Allergo comod göz damlası.

TEŞEKKÜR EDERİZ

Çocuk Alerji Laboratuvarı: (224) 295 05 07 - 295 05 08

Randevu telefonu - Çocuk Alerji ve Çocuk Göğüs Poliklinikleri Sekreter: (224) 295 05 23

Randevu çağrı merkezi: (224) 295 04 99

Çocuk Alerji ve Çocuk Göğüs poliklinikleri iletişim tel: (224) 295 05 05 ve 295 04 42