



ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI 24 SAATLİK pH

MONİTORİZASYONU UYGULAMASI

FR-HYE-04-420-02

- 24 saatlik pH monitorizasyonu gastroözefageal reflü tanısında en doğru sonucu veren, en güvenilir veren testtir. Bu testin uygulanması sırasında;
- Çocuğunuzun burnundan takılarak yemek borusunun belli bir hizasına yerleştirilen ve 20–24 saat boyunca buradaki asit miktarını ölçen bir cihaz takılır (pHmetre cihazı)
- 1 gün süreyle hastanede kalmanız gereklidir.
- Sağlıklı ölçüm için cihaz çocuğunuzun burnunda tespit edilen noktada yer değiştirmeden kalmalıdır.
- Takılan cihazın yerinde kayma olması halinde ise tetkik yanlış sonuç vermektedir.
- İşlemin bilinen bir zararı yoktur.
- Cihaz takılı olduğu süre içinde çocuğunuzun günlük yemek ve hareketlerinde herhangi bir kısıtlama yapılmamalıdır.
- Test süresince çocuğunuza asitli- gazlı, çok soğuk ve sıcak besinler yedirmeyiniz.
- Cihazın üstündeki düğmeler:
 - **Yatak düğmesi:** çocuğunuz yatağa yatarken bu düğmeye basınız. Bu düğmeye basıldığında cihazın ekranında "YATMA" yazısı belirir. Çocuğunuzun yattığı süre boyunca cihazın ekranında "YATMA" yazdığını kontrol ediniz. Çocuğunuz ayağa kalktığında ise aynı düğmeye tekrar basınız ve ekranda "KAYIT" yazısını görünüz. Bu cihazın normal(çocuk ayakta iken) kayıt halidir.
 - **Yemek düğmesi:** Çocuğunuz yemek yemeye (yeme, içme) başladığında bu düğmeye basınız ve ekranda " YEMEK YİYOR" yazısını görünüz. Yemek bittiğinde ise tekrar basınız. Ekranda "KAYIT" yazısı çıktığını kontrol ediniz.
 - **Olay düğmesi:** Çocuğunuzda reflü ile ilişkili bir şikâyet, belirti (kusma, öksürük, tıkanma gibi) olduğunda BİR KEZ bu düğmeye basınız. Cihaz takılı bulunduğu süre boyunca gözlemlediğiniz her şikâyette olay düğmesine bir kez basınız.

- **İlaç düğmesi:** Cihaz takılı iken çocuğunuza herhangi bir ilaç vererseniz bu düğmeye BİR KEZ basınız. Her ilaç verişinizde düğmeye tekrar basınız.
- Herhangi bir sorunuz olduğunda klinikte nöbetçi doktor ve hemşirelere haber veriniz.