



İYOT-131 TEDAVİ

FR-HYE-04-428-11

ÖNCESİ	TEDAVİ GÜNÜ	SONRASI
<p>***** 15 gün önce iyotsuz diyet</p> <ol style="list-style-type: none">1. TUZ (İyotsuz tuz kullanılacak)2. Süt ve süt ürünleri3. Balık ve diğer deniz ürünleri4. Salça,turşu,salamura,konserve ve hazır gıdalar5. Öksürük şurubu, gargara ve vitamin ilaçları6. İlaçlı film, tomografi, MR7. Saç boyası. <p>NOT: Gebelik çağında olanlardan gebelik testi istenecek. Sonuç tedavi günü hastanın yanında olacak.</p>	<p>Sabah hafif kahvaltı sonra AÇ!!!</p> <p>Tedavi saati: 13:00-14:00</p>	<p>**GEBELER **KÜÇÜK ÇOCUKLAR **BEBEKLER</p> <p>1 hafta boyunca bu gruptan en az 2 metre uzak durulmalı , birlikte geçirilen süre 1 saati geçmemeli.</p> <p>**Verilen iyot idrar ve ter ile atıldığından 1 hafta boyunca gün içinde sık duş alınmalı ve her seferinde temiz kıyafetler giyilmeli mümkünse ayrı tuvalet kullanılmalı</p> <p>**Tedaviden 1-2 ay sonra yeni kan tahlilleri ile (FT3, FT4,TSH) endokrinoloji polikliniğinden randevu alınmalı</p>
<p>**** Kullanılan ilaç (propylcil, tefor, tyrimazol) tedavi gününden 1 hafta önce kesilecek. İlaç tedavi gününden 2 gün sonra tekrar kesilen dozdan tekrar başlanacak</p> <p>**** Mümkünse tedavi günü özel araç ile gelinecek.</p>		