



DİŞ ÇÜRÜĞÜ TEDAVİLERİNDE LOKAL ANESTEZİ

FR-HYE-04-606-04

Bu eğitimin amacı: Diş tedavileri sırasında uygulanan lokal anestezi işlemi konusunda hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi.

Lokal anestezi işlemi nedir ve nasıl uygulanır?

Yaygın ve derin diş çürüklerinin doldurulmasında, diş çekiminde veya kök-kanal tedavisinde hastanın tedavi edilecek dişlerini içine alan çene bölgesi uygun bir lokal anestetik ajan ile uyuşturulur. Bu işlem sırasında hasta uyanıktır ve reflekslerine hakimdir.

Komplikasyonları nelerdir?

Lokal anesteziye bağlı komplikasyonlar (hastalık veya tedavi sırasında karşılaşılabilecek ve asıl sorunu daha da ağırlaştıracak yeni sorunlar) ortaya çıkabilir. Anestezi komplikasyonu 'rejyonel veya lokal anestezi uygularken veya sonrasında beklenen etkinin dışında ortaya çıkan bulgular' şeklinde tanımlanabilir. Anestezi komplikasyonları, az, orta şiddette veya ciddi olabilirler. Ortaya çıktığında şiddetli bile olsa geçici olabilir veya düşük dereceli de olsa kalıcı özellik gösterebilirler. Kullanılan solüsyona veya enjeksiyonun uygulanışı ile de ilgili olabilir. Anestetik solüsyonun emilimi sırasında vücutta sistemik veya lokal komplikasyonlar gelişebilir:

Sistemik komplikasyonlar:

- Nadiren ilacın gereğinden fazla yüklenmesine bağlı toksisite,
- Bilinmeyen nedenlere veya emosyonel faktörlere bağlı gelişen sistemik komplikasyonlar,
- Nadiren allerji,
- Nadiren anaflaktik şok.

Lokal komplikasyonlar:

- Nadiren Kontamine solüsyona bağlı enfeksiyonlar,

- Nadiren Lokal irritasyonlar veya doku reaksiyonları,

Enjeksiyonun yapılışına bağlı komplikasyonlar:

- Senkop (bayılma), trismus (ağız açma güçlüğü), ağrı veya hiperaljezi, ödem, enfeksiyon, nadiren iğnenin kırılması, anestezinin uzun sürmesi, hematom, nörolojik semptomlar (fasiyal paralizi, gözde şaşılık, kas zayıflığı, geçici körlük), anestezinin elde edilememesi.

Hastanın kendi kendine verdiği zarar:

- Anestezili bölgenin ısırılması, çiğnenmesi.

İzlem ve dikkat edilmesi gerekenler:

- Lokal anestezinin etkisi geçmeden (ortalama 2-3 saat) yemek yemeyiniz. Dudak, dil ve yanak bölgesini hissetmediğiniz için ısrabilirsiniz.
- Lokal anestezinin geçmesi sonrasında iğnenin girdiği yumuşak doku bölgesinde geçici bir ağrı oluşabilir.

Daha fazla bilgi için: U.Ü. Tıp Fakültesi, Ağız ve Diş Sağlığı Birimi'ne başvurunuz.

İletişim adresi: Uludağ Üniversitesi,

Tıp Fakültesi, Ağız ve Diş Sağlığı Birimi, Görükle, 16059, Bursa.