



**BUÜ-SUAM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI
TÜP BEBEK MERKEZİ YUMURTA TOPLAMA İŞLEMİ SONRASI
DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR**

Dok.Kodu : FR-HYE-04-729-03

İlk Yay.Tarihi : 23 Mart 2011

Sayfa
1 / 1

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Hasta Adı/Soyadı:

Doğum Tarihi (gün/ay/yıl): / /

Protokol No:

- Yatak istirahatini takiben hastaneden ayrılabilirsiniz.
- 1 – 2 gün süreyle adet ağrısına benzer bel ve kasık ağrısı, az miktarda vaginal kanama olabilir.
- Gebelik testi yapılincaya kadar cinsel ilişkide bulunmayınız.
- Nefes almada zorluk, karında aşırı şişkinlik, bulantı, kusma gibi yakınmalarınız olursa kliniğimize haber veriniz.
- Yumurta toplama işlemi sonrası eve gider gitmez size verilen ilaçlara başlayınız.
- **PROGESTAN TABLET 200 mg**, Günde 3 kez (Saat 08:00 – 16:00 – 24:00)
2'şer tablet vagina içerisine koyunuz.
- **CRINONE GEL %8**, Günde 1 kez
Sabahları vagina içerisine sıkınız.
- **PREGNYL amp. 1500 IU**, Belirtilen tarihten itibaren 3 günde 1 kez
kalçadan yaptırınız.
- Yumurta toplama işleminin ertesi günü kliniğimizi arayarak embriyolar ve transfer günü hakkında bilgi alınız.
- Embriyo transfer işleminize dolu mesane ile geliniz.
- Aç olmanıza gerek yoktur.

Bilgi veren:

Sorularınız için 09:00 – 16:00 saatleri arasında 0224 295 2525 numaralı telefondan kliniğimize ulaşabilirsiniz.