



VİTREUS KANAMASI (GÖZ İÇİ KANAMA)

FR-HYE-04-314-15

Göz İçi (Vitreus) Kanama

Ani görme azalması ile oluşan bu durum;

- göz içinde ki jöle kıvamlı sıvı içerisine travmaya,
- damar tıkanıklığına,
- yırtığa,
- şeker hastalığına,
- yüksek tansiyona bağlı olarak kanama olması durumudur.

Bu tanıyı alan hastalara doktor tarafından yüksekte yatması, göz bebeği büyütücü damlalar ve belli aralıklarla kontrol önerilir.

Uzun süredir çekilmeyen kanamalarda veya alttaki nedene göre değişen öncelikte erken dönemde cerrahi uygulanır. Vitrektomi denen cerrahi işlemde kanama temizlenir ve altta yatan duruma göre ek tedavi yaklaşımında bulunulabilir (lazer, göz içi enjeksiyon, gaz verilmesi, silikon verilmesi gibi).

Silikon verilen hastalarda silikon tekrar bir cerrahi ile alınır.

Cerrahiye bağlı tekrar kanama, katarakt, göz tansiyonu yükselmesi, nadiren mikrop kapması gibi durumlar ortaya çıkabilir. Tekrar cerrahi gerekebilir.

Bazı durumlarda takip ile kanama çekilir.