



DİGOKSİN KULLANAN ÇOCUK HASTALAR İÇİN ÖNERİLER

FR-HYE-04-422-02

Digoksin kalp hastalıklarında dikkatle kullanılması gereken kuvvetli bir kalp kası güçlendiricisidir. Kullanılmasındaki aşağıdaki önerilere mutlaka uyulması gerekmektedir:

- ❖ İlacınızı hep aynı saatlerde vermeye özen gösterin. Örneğin sabah 9,00- akşam 9,00 gibi. Aç veya tok karına alınabilir.
- ❖ Digoksin damlayı çocuğunuzun ağızına damlatmayın, fazla kaçabilir. Bir çay kaşığı suyun üzerine önerilen miktarda digoksin damlatıp içirin. Eğer fazla damlarsa bunu döküp tekrar doğru miktarda damlatın.
- ❖ Digoksin dozu çocuğun kilosuna ve ihtiyacına göre düzenlenmektedir. Kendiliğinden ilaç miktarını azaltmayın ve artırmayın. Gereğinde ilacın dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.
- ❖ Digoksin sürekli kullanılacak bir ilaçtır. Kullanıma ara vermeyin. Bitmeden yenisini alın, hatta piyasada bulunmama olasılığına karşı yedek ilaç bulundurun. Yolculuk ve misafirlik gibi durumlarda yanınızda taşıyın.
- ❖ İlaç fazla alındığında veya hastanın ilaca duyarlı olması halinde zehirlenme belirtileri görülebilir. Aşağıdaki bulguları gördüğünüzde (aşırı bulantı ve kusma, kalp atımlarında belirgin yavaşlama veya hızlanma veya düzensizlik, büyük çocuklarda görme bozuklukları gibi.) digoksini vermeyi kesin ve çocuk doktorunuza veya fakültemiz çocuk kardiyoloji veya çocuk acil polikliniklerinden birine telefon edin veya başvurun.
- ❖ İlaçları çocuklardan uzak tutun. Eğer yanlışlıkla fazla miktarda ilaç alınmışsa hastayı hemen kusturun ve en yakın hastaneye başvurun yanınızda polikliniğimizce verilen poliklinik izlem kartını mutlaka bulundurun.

İletişim Adresi:

Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
Görükle 16059, Bursa
Tel: 0-224-2950450
Çocuk Acil Tel: 0-224-2953271