



KORONER ANJİYO / SAĞ-SOL KALP KATETERİZASYONU / KORONER BALON+STENT

FR-HYE-04-502-01

İŞLEM ÖNCESİ BİLGİLER

- 1- Koroner anjiyografi ve/veya sağ-sol kalp kateterizasyonu tanı amacıyla yapılan bir işlemdir.
- 2- Koroner anjiyografide amaç kalbi besleyen koroner damarların opak (boyalı) madde ile filmini çekmek, daralma veya tıkanma olup olmadığını belirlemektir.
- 3- Sağ-sol kalp kateterizasyonu'nda amaç kalp boşluklarının basınçlarını ölçmek ve opak madde yardımıyla filmlerini çekmektir.
- 4- İşlem lokal anestezi ile kasık bölgesinden(veya koldan) uygun kateterler kullanılarak yapılır.
- 5- İşlem öncesi gece 24:00'ten sonra aç kalınmalı aksi söylenmedikçe bir şey yememeli ve su içmemelisiniz.
- 6- Sabah ilaçlarınızı alıp almamak gerektiğini doktorunuza sorunuz. Genellikle az bir su ile ilaçlarınızı almanız söylenecektir. İlaçlarınızı yanınızda getiriniz.
- 7- İşlem öncesi duş alarak geliniz. Her iki kasık bölgenizin, bacaklarınızın kasığa yakın üst kısmı dahil tıraş edilmesini ve kıllardan tamamen arındırılması gerekmektedir.
- 8- İşlem öncesi kolunuzdan serum takılacaktır. Diyabetiniz varsa onun içinde ayrı bir serum takılacaktır.
- 9- İşlem sırasında üzeriniz steril olarak örtü ile örtülecektir. Bunlar steril ortamın sağlanması için gereklidir.
- 10- İşlem sırasında nefes tutma, derin nefes alma gibi doktorunuzun talimatlarını yerine getiriniz.

İŞLEM SONRASI BİLGİLER

- 1- İşlemin hemen sonrasında anjiyografi laboratuvarında veya servisteki yatağınızda işlem bölgesindeki sheat çekilerek üzerine 10-15 dakika baskı yapılacaktır. Bu sırada bası yerinde hafif ağrı ve bacağınızda hafif bir uyuşma hissi olabilir.
- 2- İşlem yerine kum torbası 5-6 saat konulacak, bazen özel bası cihazları konulabilir.
- 3- İşlemden 30-60 dakika sonra su, meyve suyu, çorba gibi sıvı gıdalar tüketilebilir,3 saat sonra yemek yiyebilirsiniz.
- 4- Anjiyografide kullanılan opak madde idrar söktürdüğü için böbreklerin çalışmasını korumak için çok miktarda sıvı içmeniz önerilir.(Yarım saat'te bir bardak)
- 5- İdrar için ördek veya sürgü kullanacaksınız.
- 6- Ayağa kalkmadan evvel hemşireyi bilgilendiriniz.
- 7- İşlemden bir gün sonra duş alabilirsiniz. Bandajınızı ıslatıp çıkarabilirsiniz. Pansuman gerekmez.
- 8- İlk birkaç gün ağır aktivitelerden kaçınınız.(koşma, merdiven çıkma, dans etme, bisiklete binme)

- 9- Kateter giriş yerinde ani kanama, artan ve büyüyen şişlik, bacakta kızarıklık ve ısı artışı, uyuşukluk, yaygın morarma şikayetleri olması halinde doktorunuza başvurunuz.

KAG SONRASI BALON YA DA STENT İŞLEMİ YAPILIRSA

- 1- İşlem sonrası yoğun bakım ünitesine alınacaksınız. Yoğun bakıma alınmak rutin takip amacıyla yapılan bir uygulamadır.
- 2- İşlemden esnasında ve işlem sonrasında kan sulandırıcı ilaçlar verildiği için kasık bölgenizdeki plastik borucuk (sheat) 4-5 saat kalacaktır. Bu esnada o bacağınızı bükmeminiz. Bu süre sonunda sheat çekilerek üzerine 10-15 dakika baskı yapılacaktır. Bası yerinde hafif ağrı ve uyuşma hissi olabilir.
- 3- Stent takılan hastaların doktoru tarafından önerilen kan sulandırıcı ilaçları aksatmadan kullanması hayati öneme sahiptir. Doktorunuzun uygun gördüğü tarihte mutlaka kontrole geliniz. İlaçların kesilmesi gereken bir durumda doktorunuza danışmadan kesmeyiniz.